



PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE SÍFILIS CONGÉNITA

P ¿QUÉ ES LA SÍFILIS CONGÉNITA?

La sífilis congénita es una infección de transmisión sexual (ITS) que se produce cuando una madre con sífilis contagia a su bebé durante el embarazo o el parto. La mayoría de las veces, la sífilis se transmite de la madre al bebé durante el embarazo, pero puede ocurrir durante el parto vaginal si el bebé entra en contacto con una llaga de sífilis.

Una futura madre puede contagiarse de sífilis si tiene relaciones sexuales sin protección o tiene contacto íntimo con una persona portadora de la infección.

P ¿QUÉ SUCEDE SI MI BEBÉ TIENE SÍFILIS CONGÉNITA?

Si un bebé tiene sífilis congénita y no recibe tratamiento, puede tener problemas de por vida, como convulsiones y retrasos en el desarrollo, o peor aún, puede morir a causa de la infección. La manera en que la sífilis congénita afecta la salud de su bebé depende del tiempo que usted tuvo sífilis y si recibió tratamiento contra la infección o cuándo lo recibió. Hasta el 40% de los bebés cuyas madres tienen sífilis sin tratar puede morir a causa de la infección.

Durante el embarazo, las complicaciones pueden incluir lo siguiente:

- aborto espontáneo (pérdida del bebé durante el embarazo);
- parto de un feto muerto (el bebé nace muerto);
- nacimiento prematuro (el bebé nace antes de tiempo);
- bajo peso al nacer;
- muerte poco después del nacimiento.

Después del nacimiento, su bebé podría tener lo siguiente:

- huesos deformes;
- anemia grave (un recuento sanguíneo bajo que no puede trasladar el oxígeno al resto del cuerpo);
- agrandamiento del hígado y el bazo;
- ictericia (la piel o los ojos se tornan de color amarillo);
- problemas neurológicos y nerviosos, como ceguera o sordera;
- meningitis;
- retrasos en el desarrollo.

P ¿CÓMO SÉ QUE TENGO SÍFILIS O QUE MI BEBÉ TIENE LA INFECCIÓN?

La única manera de saber si usted o su bebé tiene sífilis es mediante un análisis. Su proveedor de atención médica debería hacerle el análisis de detección de sífilis congénita en las consultas del primer y tercer trimestre del embarazo. Si no lo hace, defienda la salud de su bebé solicitando el análisis de sangre. Si no tiene seguro médico ni recibe atención prenatal, consulte al Departamento de Salud del condado para hacerse el análisis gratuito.

Si tiene sífilis, es importante que le pida a su pareja sexual que se haga el análisis de detección de la infección. Los dos deben recibir tratamiento. De lo contrario, la infección puede persistir y afectar al bebé.

P ¿EXISTE TRATAMIENTO PARA LA SÍFILIS? ¿SE PUEDE CURAR?

La sífilis puede curarse en su caso y el de su bebé, pero es importante que se trate de inmediato. El tratamiento puede ser gratuito y hacerse con una inyección de antibióticos comunes o vía intravenosa, que le administrará el médico. Cuanto antes reciba tratamiento, habrá menos probabilidades de que usted y su bebé tengan complicaciones a causa de la infección. Tanto usted como su pareja deben recibir tratamiento. De lo contrario, la infección puede reaparecer y afectar al bebé.

P ¿LA SÍFILIS CONGÉNITA SE PUEDE PREVENIR?

La sífilis congénita es totalmente prevenible. La única manera de proteger a su bebé es protegiéndose usted de la infección durante el embarazo. **Formas de prevenir la infección:**

- Utilice condón cuando tenga relaciones sexuales.
- Limite la cantidad de parejas sexuales.
- Asista a todos los chequeos de control prenatal.
- Hable con su médico si cree haber estado expuesta a la infección o si pudo haberlo estado.
- Hágase análisis, aunque crea no tener sífilis.
- Dídale a su pareja que se haga el análisis de detección de sífilis. Tanto usted como su pareja deben recibir tratamiento. De lo contrario, la infección puede persistir y afectar al bebé.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN StopSyphilisFL.com



Florida
HEALTH